



پیارستان سیدالشہدا (ع) قم‌آباد

واحد آموزش سلامت

کد سند: SSH-BGC-PE-03

ویرایش: ۱ بازنگری: ۲

تهیه ننده: آزاده خسروانیان

نایبد سوپرولیزر آموزشی	نایبد مسئول علمی بخش



توجه:

با توجه به جدول زمان باز شدن بخیه، زمان کشیدن بخیه ها حتما باید با هماهنگی پزشک معالج تعیین شود.

تفصیل:

هر گونه کمبود در تعذیه ترمیم زخم را به تاخیر می اندازد برای تسريع بهبود زخم از تمام مواد غذایی استفاده کنید. می توانید از گوشت قازه - تخم مرغ - لبنیات شیر و ماست، هیوه و سبزیجات نازه و غفر گرد و استفاده نمایید.

در صورت درد غیر قابل کنترل و تورم و قرمزی در اطراف بخیه و خروج ترشح چرکی از زخم حتماً پزشک را مطلع نمایید. هر روز محل جراحی شده را بررسی کنید تا چرک (عفونت) نگردد باشد. تب بالایک علامت مهم و هشدار دهنده جهت بروز عفونت در محل بخیه میباشد. ممکن است نیاز به واکسیناسیون گزار داشته باشید که طبق دستور پزشک حتماً نزدیق شود.

نکه:

زمان کشیده شدن بخیه ها به محل بخیه و اکنث بدن و دستور پزشک بستگی دارد. نخ های بخیه جذبی بطور خود بخودی بعد از ۲ تا ۶ ماه در بافت بدن متلاشی و خود بخود از بین میرونند. نخ های غیر جذبی نیاز به کشیدن بخیه دارند.

مددجوی گرامی جدول زیر کمک هی کند زمان باز شدن بخیه خود را بداند.

کشیدن بخیه	محل زخم
۳ تا ۵ روز	صورت
۱۰ تا ۱۴ روز	پوست سر
۷ تا ۲۱ روز	دست و پا
۷ تا ۱۴ روز	قفسه سینه، پشت، شکم
۱۴ تا ۲۱ روز	کف دست و پاها

توجه: از مواد ضد عفونی کننده نظیر بنادین و آب اکسیرنه و الکل جهت ضد عفونی کردن بخیه استفاده نکنید زیرا باعث آسیب بافت و تاخیر در بهبودی زخم می شود. مددجوی گرامی بهتر است برای اطمینان از درست بودن روش پاسمنان از پرستار کمک بخواهد.

از دستکاری زخم خوداری نماید. محل بخیه شده بهتر است جهت کاهش درد و تورم در سطح بالاتر از قلب قرار گیرد. در هنگام استراحت و خواب عضو بخیه شده را می توان بالش بالا نگه داشت. در هنگام درد می توان با دستور پزشک مسکن استفاده شود. در صورت تجویز آنتی بیوتیک دارو سر ساعت و مرتب میل شود.

توصیه می شود محل بخیه شده را جهت کاهش به جاماندن جای زخم در مقابل افتاد قرار ندهید.

مددجوی گرامی به هشدارها توجه کنید :

محل بخیه جراحی در حالت عادی کمی قرمز می شود و ورم می کند. کمی هم سوزش و خارش دارد. چند روز اول بعد از جراحی، کمی ترشح در محل بخیه دیده می شود که جای تگرانی ندارد. ولی اگر بعد از چند روز، میزان ترشحات کم نشد و یا رنگ آن قرمز روش به همراه خون بود و یا چرکی شد، حتماً به پزشک خود مراجعه کنید.

بخیه: بخیه زدن بهترین روش برای ترمیم پارگی های پوست است در این روش از نخ مخصوص بخیه برای دوختن لبه های یک زخم و نزدیک کردن آنها به هم استفاده می شود.

مددجوی گرامی ۳ هدف اصلی بخیه زدن را بدانیم :
۱- جلوگیری از خونریزی محل پارگی و پیشگیری از ایجاد عفونت در زخم
۲- باز گرداندن کارکرد بافت های آسیب دیده
۳- دستیابی به نتایج زیبائی محل آسیب دیده با به حداقل رساندن جای ماندن زخم ترمیم شده

نکات کلیدی مراقبت از بخیه:

محل بخیه شده را تمیز و خشک نگهدازد باید از زخم طوری مراقبت شود که سه روز پس از بخیه با اجازه پزشک محل زخم شسته شود. زخم محل جراحی را نخراسید و یا در آب غوطه ور نکنید (مثلًا در وان حمام).

توجه: مرتبط نگهداشتن زخم باعث باز شدن بخیه و عفونت موضع می شود محل بخیه ها را روزانه با استفاده از محلول نرمال سالین (سرم شستشو) خشک عفونی و بعد از خشک کردن مجدد پاسمنان نماید. قبل از پاسمنان مجدد بخیه، اجازه دهید زخم هوا بخورد تا خشک شود و یا با دستمالی تمیز به آرامی آن را خشک کنید.