




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات دانشگاهی شیراز



شکستگی استخوان ساق پا

❖ با تغییر وضعیت و آرامش فکری و پرتن حواس، کاهش درد کمک کنید.

❖ در صورت داشتن علائم عفونت از جمله تب، لرز، قرمزی و خروج ترشح چرکی از ناحیه عمل شده و حساسیت در لمس به پزشک مراجعه کنید.

❖ از روز سوم به بعد میتوانید حمام بروید. بخیه هارا تمیز و خشک نگه دارید. تعویض پانسمان باید بعد از مرخص شدن در منزل توسط پرستار یا همسر اینبار که در بیمارستان آموزش دیده انجام شود.

❖ بخیه های ناحیه عمل شده دو هفته پس از عمل طبق نظر پزشک کشیده میشود.

❖ تنفس عمیق و سرفه به خروج خلط از ریه کمک میکند.

❖ بیوست از عوارض بعد از عمل می باشد که به دلیل کاهش حرکت و استفاده از داروهای ضد درد می باشد. آب کافی، حرکت سریعتر - مصرف مواد غذایی حاوی فیبر از جمله سبزیجات - غلات - میوه های تازه می تواند برای حلولگیری از بیوست مصرف شود.

کنترل درد

❖ درد مدت کوتاهی پس از جراحی به سرعت کاهش می یابد. بعد از ۲ الی ۳ روز اغلب فقط گاهی برای رفع سفتی و گرفتگی عضلات به داروهای مسكن طبق دستور پزشک نیاز پیدا می کنید.

❖ استفاده از کیسه یخ می توان به کنترل درد و تورم کمک کنید.





بیمارستان سیدا شهدا (ع) قادآباد

واحد آموزش سلامت

کد سند: SSH-BGC-PE-03

ویرایش: ۱ بازنگری: ۲

تهیه کننده: آزاده خسروانیان

تأیید سپه و ایزرا مأموری	تأیید مسئول علمی بخش

- ❖ سابقه شخصی یا خانوادگی سکته مغزی، سکته قلبی یا حمله سکته مغزی گذرا

پیشگیری از سکته مغزی

- ✓ ورزش منظم

- ✓ استفاده از رژیم غذایی کم چربی و مصرف میوه ها و سبزی ها در رژیم غذایی روزانه
- ✓ عدم استعمال دخانیات
- ✓ کنترل طبی هرگونه اختلال مزمن مثل دیابت
- ✓ کنترل مرتب فشار خون و در صورت بالا بودن مراجعه به پزشک



اقدامات اولیه در مواجهه با سکته مغزی چیست؟
هنگام برخورد بایمار سکته مغزی باید اطراف این آرامش خود را حفظ کرده بیمار را در حالت سکون قرار داده و با اورژانس تعاس بگیرند گاهی بیمار نبی هوش می شود و به زمین می افتد و حتی قدرت تکلم را از دست می دهد. در این زمان نباید فریاد کرد و بدن بیمار را تکان داد این اقدامات برای بیماران مبتلا به سکته مغزی غالباً وضع بیمار را وخیم تر می کند.

۲

بهار ۱۴۰۱

سکته مغزی چیست؟

سکته مغزی یعنی بسته شدن یا پاره شدن یک شریان مغزی که به دنبال آن اختلال در گردش خون آن ناحیه از مغز ایجاد شده و موجب بروز علائمی مثل فلج نیمه بدن، اختلال تکلم و اختلال در راه رفتن می شود.
سکته مغزی زمانی اتفاق می افتد که خون رسانی به قسمتی از مغز متوقف شود. در نتیجه ترسیدن خون، سلول های مغز آسیب دیده یا از بین می روند بسته به محل درگیر شده در مغز این آسیب مجرم به عالم مخلنگی می شود که می تواند دست و پای فرد، صورت، توانایی راه رفتن و صحبت کردن او را تحت تأثیر قرار دهد. شیوع حمله سکته مغزی در کشورهای در حال توسعه، پرخلاف کشورهای پیشرفته از جمله ایران روبرو با افزایش است.

علل بروز سکته مغزی چیست؟

- ❖ تبخیم و سخت شدن دیواره رگ های خونی
- ❖ فشار خون بالا
- ❖ چربی خون بالا
- ❖ دیابت (بیماری قند خون)
- ❖ چاقی
- ❖ استعمال دخانیات
- ❖ انجام ندادن فعالیت مناسب بدنی و چاقی و اضافه وزن
- ❖ مصرف الکل
- ❖ رژیم غذایی پر چربی یا بر نمک

۱