


## فیبر پلاسیون دهلیزی چیست ؟

در شرایط طبیعی قلب با ضربان منظم کار می کند . برخی از سلولهای قلب ، پیامهای الکتریکی ایجاد می کنند که سبب انقباض قلب و پمپ خون می شوند . که به صورت سیگنالهای الکتریکی در نوار قلب نشان داده می شود . پزشک شما نوار قلب شما را خوانده و مشخص می کند که آیا پیامهای الکتریکی قلب شما طبیعی هستند یا خیر ؟

در فیبر پلاسیون دهلیزی دو حفره فوقانی قلب فاقد ضربان مطلوب می باشد به جای ضربان منظم طبیعی ، دهلیزها به شکل غیر منظم و تند منقبض می شوند . پمپ کردن مناسب خون توسط قلب مهم است چرا که با پمپ مناسب خون توسط قلب ، نیازهای اکسیژن و تغذیه ای بدن تامین می شود . شما می توانید با فیبر پلاسیون دهلیزی زندگی کنید اما این مشکل منجر به سایر مشکلات ریتم قلبی و خستگی مزمن ، نارسایی قلبی و بدتر از همه افزایش احتمال مغزی می شود . جهت کنترل این مشکل مراجعه منظم به پزشک ضروری می باشد .

## علامه فیبر پلاسیون دهلیزی :

- ۱- ضربان سریع و نامنظم
- ۲- تپش قلب
- ۳- سرگیجه
- ۴- تعریق
- ۵- درد یا فشار در قفسه سینه
- ۶- تنگی نفس
- ۷- اضطراب
- ۸- خسته شدن زود هنگام در زمان فعالیت
- ۹- غش کردن ( سنکوپ )



مهم بودن

آزمایش

PT-PTT-

INR

در مصرف

وارفارین

کد سند: SSH-BGC-PE-03

وبسایت: بازنگری ۱



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس

بیمارستان حضرت سیدالشهدا (ع) - قادرآباد

## فیبر یلاسیون دهلیزی (AF)

گردآورنده: نسیمه خسروانیا

رشته: پرستاری

منبع: کتاب برونر و سودارث ۲۰۱۸

بهار ۱۴۰۱


تایید سرپرست علمی	تایید واحد آموزش سلامت

اگر قرص وارفارین مصرف می نمائید در فواصلی که پزشکتان آن را تعیین می نماید ، آزمایش خون پی تی و آی ان آرچک کنید . این فواصل نباید بیشتر از یک ماه باشد .

اگر مبتلا به بیماری قلبی می باشید یا قبلاً دچار سکته قلبی شده اید ممکن است اعضای خانواده شما در معرض خطر این بیماریها باشند .

با تغییر در شیوه زندگی می توان از ابتلا به بیماری قلبی جلوگیری کرد .

شما می توانید از کتا بچه ها و بروشورهای علمی جهت انتخاب زندگی سالم تر و کاهش میزان خطر کنترل بیماری و مراقبت از افراد ، مورد علاقه آنان استفاده کنید .



## برای درمان فیبر یلاسیون دهلیزی :

ممکن است پزشک از داروهای مانند مهار کننده های بنا یا داروهای ضد آریتمی ، یا از داروهای دیژیتال ، مهار کننده های کانال کلسیم یا آمیودارون جهت کمک به آهسته نمودن ضربان قلب یا برگشت ضربان قلب استفاده کند .

گاهی اوقات فیبر یلاسیون دهلیزی را با شوک الکتریکی می توان درمان نمود . ممکن است شوک ضربان قلب را به شکل طبیعی در آورد .

## نکته مهم :

ممکن است پزشک شما داروهای را جهت پیشگیری از ایجاد لخته خون برای شما تجویز نماید . دو نمونه از این داروها ، داروهای ضد انعقادی و ضد پلاکتی مانند وارفارین یا آسپرین می باشند .

در صورت مصرف داروهای آسپیرین یا وارفارین به پزشک ، دندانپزشک و داروساز خود اطلاع دهید . اگر دچار هر گونه خونریزی یا کبود شدگی غیر طبیعی یا سایر مشکلات شدید فوراً با پزشک خود مشورت کنید .