

## هشدار سلامتی

رعایت بهداشت فردی

و شستشوی دست ها

با آب و صابون قبل از  
هر گونه مواد غذایی را  
جدی بگیرید.

منبع کتاب پرستاری کودکان مارلو ۲۰۱۵  
برای تعاملی جامعه خود با بهبود اموزش تلاش کنیم

- اگر کودک استفراغ دارد تا چند ساعت به اوچیزی ندهید و سپس مایعات (آب) در حجم کم به کودک دهید چنانچه استفراغ نکرد مایعات و سپس تغذیه کودک را از سر برگیرید.

برای پیشگیری رعایت موارد زیر ضروری است:

- دست ها را بعد از توالت و قبل از خوردن غذا بشویید.
- به کودک خود آب جوشیده بدهید و میوه ها و سبزیجات را قبل از استفاده ضدغذوفونی کنید.
- در تمامی مراحل تهیه غذا (از خرید تا پخت غذا) نکات بهداشتی را رعایت کنید.

حیوانات می توانند عامل انتقال میکروب ها باشند. در صورت دست زدن به آنها یا قفسه هایشان دستان خود را بشویید



بسمه تعالیٰ

در برخورد با کودک مبتلا به  
اسهال واستفراغ چه باید کرد؟



بیمار گرامی :

از اعتماد و حسن انتخاب جنابعلی نسبت به این مجتمع درمانی کمال تشکر را داریم .

پمفت آموزشی که در دست شماست حاوی اطلاعات ضروری در خصوص بیماری فعلی شما و چگونگی روند درمان و مراقبت آن می باشد.

**دانشگاه علوم پزشکی شیراز**

**بیمارستان سیدالشهداء (ع) قادر آباد**

### شما چه کمکی می توانید بکنید؟

- در کنار کودکتان بمانید درباره رعایت نکات پهدانشی دقت و حساسیت داشته باشید.
- چنانچه کودک شما از شیر خشک استفاده می کند ، تمام وسایل اورا ضد عفونی کرده و قبیل و بعد از هر بار تعویض پوشک ، دست های خود را بشویید.
- از دادن نوشیدنی های ترش به کودک اجتناب کنید چون ممکن است معده کودک را بستر تحریک کندر زمان اسهال از آمیوه های تجاری پرهیز کنید.
- از دادن آمیوه های شیرین ، نوشابه چای و نوشیدنی های کافئین دار اجتناب کنید چون باعث بدتر شدن اسهال می شود .
- شیر خشک بیمار را بدون تجویز پزشک تغییر ندهید.
- از دادن آنتی بیوتیک بدون تجویز پزشک خودداری کنید .
- هرگز شیر مادر را قطع نکنید.

در کودک مبتلا به اسهال ، هیچ چیز به اندازه مایعات از دست رفته ، اهمیت ندارد . درمان این مشکل از طریق جبران مایعات از دست رفته می باشد. منظور بیشتر دریافت مایعات خوراکی است تا تزریقی مگر در کودکی که خیلی بدهال باشد که باید از سرم تزریقی استفاده کرد.

### اسهال و استفراغ غیر از اختلال آب و املاح چه عوارض دیگری دارد؟

اگر اسهال حاد درمان نشود درمدت کوتاهی وزن کودک کاهش می یابد که جبران آن سخت است از سویی دیگر اسهال سبب بی اشتیابی می گردد که این خود سوء تغذیه را در پی دارد و باعث بدتر شدن اسهال می شود . اسهال و سوء تغذیه یک چرخه هستند پس در اسهال نباید تغذیه را قطع کرد و تا مدتی بعد از اسهال باید یک وعده به تغذیه کودک اضافه کرد و از غذاهای کالری دار استفاده نمود نه فقط تغذیه کودک ، کته و ماست باشد.

### پزشک چه اقداماتی انجام خواهد داد؟

احتمالاً پودر (او آر اس) را تجویز خواهد کرد این پودر شامل قند و مواد معدنی ضروری می باشد که از راه اسهال و استفراغ از بدن کودک دفع شده است . اگر کودک شما بدهال باشد ، پزشک برای جبران مایعات از دست رفته و تزریق سرم ، کودک را در بیمارستان بستره خواهد کرد.

### چه مقداری دفع مدفع را اسهال می گوییم.

در سنین کودکی افزایش دفعات و افزایش میزان آب مدفع برای تعریف اسهال مهم است. در اسهال ، مدفع شل و آبکی تر و تعداد دفعات نسبت به یه قبل ، زیاد تر شده است .

### بی توجهی به اسهال و استفراغ چه عوارضی برای بچه ها دارد؟

مهم ترین عارضه ، اسهال و استفراغ کم آبی بدن و اختلالات الکترولیتی است . حتی با اسهال خفیف هم مقدار زیادی مایع از بدن بیمار دفع می شود . کم آبی درجات مختلفی دارد که درجه پایین آن می تواند قابل تحمل باشد ، اما درجه های متوسط و شدید آن خطرناک است و مهم ترین علل مرگ و میر و ناتوانی بچه هاست .

علاجم کم آبی که باید به آن توجه کرد و فوراً به مرکز درمانی مراجعه کرد :

✓ ملامه فرو رفته

✓ پشم های ۵۰۰ افتاده

✓ گریه بدون اشک

✓ کم شدن دفع ادرار

✓ فشکی دهان