

* میزان نفکی که هنگام پخت به غذا اضافه میکنید را کاهش دهید.

* برای اجتناب از مصرف بی روزی نفک: بر سر سفره از نفکدان استفاده نکنید.

* غذاهای گنسرو شده و بسیاری از مواد غذایی بسته بندی شده و آماده دارای مقادیر زیادی نفک هستند، به همین دلیل بهتر است مصرف این مواد غذایی را محدود کنید.

* برای پنهان طعم غذا و کاهش مصرف نفک در هنگام تهیه غذاها به جای نفک از سبزیهای تازه یا خشک مثل آوشن، شوید، سیر، آب لیمو ترش یا آب نارنج و ... استفاده کنید.

* مصرف غذاهای شور مثل آجیل شور، انواع قرآورده های غلات حجمی شده، چیزی، انواع ترشیها، انواع شور نظیر خیار شور و کلم شور، فاهی دودی، سوسیس و کالباس و غذاهای گنسروی را کاهش دهید.

* جوش شیرین که ممکن است در انواع نان و گیک به کار رود دارای مقدار زیادی (سدیم) عنصر هوثره نفک است. بنابراین در افرادی که به علت ابتلاء به بیماری محدودیت مصرف نفک دارند مصرف مواد حاوی جوش شیرین هم باید بسیار محدود شود.



توصیه شده برای مصرف نفک باید کمتر از ۳ گرم در روز باشد.

نکاتی درباره نفک:

النفک خوراکی حامل ترکیب دو عنصر سدیم و کلر میباشد. ترات نفک بر قشار خود به علت وجود عنصر سدیم (ماده بوتر بر نفک) در این ترکیب است. در افرادی که سطح سدیم خون بالا و سطح پتاسیم خون پایین است خطر افزایش قشار خون که خود مسبب بیماریهای قلبی و سکته است، افزایش سیابد.



صرف زیاد نفک یا غذاهای شور چه عوارضی را در بی خواهد داشت؟

قشار خون بالا سکته قلبی، سکته مغزی، پوکی استخوان، سرطان معده، آسم، ادم یا ورم همه از عوارض مصرف زیاد نفک است.



♦ برای پیشگیری از افزایش قشارخون و بیماریهای قلبی- عروقی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟

قزاریت دریافت پتاسیم در حد توصیه شده، قشار خون را کاهش میدهد. کاهش مصرف سدیم نیز قشارخون را کاهش داده و از مرگ ناشی از بیماریهای قلب و عروق جلوگیری میکند. در حال حاضر در کشور ما نوعی از نفکهای خوراکی تولید میشود که از پتاسیم به جای سدیم در ترکیب آن استفاده شده است. این نوع نفک (نفک پتاسیم) فقط در داروخانه های کشور جهت مصرف برخی گروههای خاص از جمله افراد مبتلا به قشار خون بالا قابل عرقه میباشد.

نفک پتاسیم برای درمان و جلوگیری از کاهش سطح پتاسیم در افرادی است که به سبب مصرف داروهای مذرع یا برخی داروهای دیگر، یا برخی بیماریهای خاص ممکن است دچارت پتاسیم خون شوند. این نوع نفک با تجویز پزشک مورد استفاده قرار میگیرد.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده است که میزان دریافت سدیم در بالغین باید کمتر از ۲۳۰۰ میلیگرم در روز (حدود ۵ گرم نفک) باشد. در سنین پایینتر (۵۵-۰ سال) حداقل میزان

نمک یددار تصفیه شده چیست و چرا باید فقط از این نوع
نمک استفاده کنیم؟



♦ توجه:

- از مصرف نمک دریا که قادر ید کافی و دارای ناخالصی است خوداری کنید.
- همواره به وجود پروانه ساخت از وزارت پهداشت روی پسته پندی نمک یددار تصفیه شده توجه نمایید.
- دقت کنید که عبارت «نمک ید دار تصفیه شده» بر روی پسته پندی نمک درج شده باشد و از خرید هرگونه نمک با عنوان «صادراتی صنعتی» یا «نمک دریا» خودداری نمایید.

نمک باید به مقدار بسیار کم مصرف شود و همان مقدار کم نمک نیز فقط از نوع تصفیه شده یددار باشد

نمک تصفیه شده نمکی است که در آن ناخالصیهای نامحلول مانند قلزات سنگین و همچنین ناخالصیهای محلول مانند آهک، شن و هاسه طی فرآیندی در کارخانه حذف شده است.

نمک خوراکی باید از نوع یددار و تصفیه شده باشد. نمکهای تصفیه شده یددار به دلیل خلوص بالا هیزان ید را بهتر و به حدت بیشتر حفظ میکنند.

نگهداری و ذخیره نمودن نمک یددار به مدت طولانی (بیش از ۶ماه) موجب از دست رفتن بخشی از ید آن میشود. برای حفظ ید در نمک، باید نمک را دور از نور و رطوبت و در ظرف در پسته پلاستیکی، چوبی، سفالی و یا شیشه های رنگی و تیره نگهداری کرد و جهت افاقه کردن آن به غذا در زمان طیخ، نمک را در انتهای پخت افاقه نمود تا ید آن در حداقلر مقدار حفظ شود.

نمک تصفیه نشده به علت داشتن ناخالصی در افرادی که سابقه بیماریهای گوارشی، کلیوی و کبدی دارند و حتی مصرف مداوم آن در افراد سالم منجر به بروز ناراحتیهای گوارشی، کلیوی، کبدی و حتی کاهش جذب آهن در بدن میشود.


ز خرید هر نوع نمک با عنوان "صادراتی- صنعتی" خودداری نمایید.



دانشکده علوم پزشکی کشور
پیمارستان سیدالشیداء (ع)

واحد آموزش به بیمار

نمک



1- Available from
<http://www.zums.ac.ir/files/mahneshan-behdasht/mataeb.pdf>
2- مطالب آموزشی پسچ اطلاع رسالی کامل مصرف نمک-

منابع